

Додаток 1

Програмні положення стосовно вакцинації під час пандемії COVID-19 та зниження ризику передачі SARS-CoV-2 при проведенні вакцинації

Надання послуг з імунізації має регулюватися національними рекомендаціями щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах, включаючи наступне:

а. Мінімізація можливості впливу COVID-19

- Використовувати наявні засоби зв'язку для інформування про послуги імунізації, призначення часу відвідування вакцинальних сесій і забезпечення звітності про несприятливі прояви після імунізації (НППІ).
- Розглянути можливість суміщення візитів для вакцинації з патронажними відвідинами немовлят, а також скорочення числа відвідуваних кабінетів, об'єднавши медогляд з вакцинацією під час таких візитів.

б. Адміністративні засоби управління

- Навчити основний і молодший медперсонал навичкам профілактики інфекції SARS-CoV-2 під час імунізації.
- Розглянути можливість організації мобільних пунктів вакцинації або роботи на виїзді (де доцільно) для полегшення доступу до імунізації із забезпеченням мінімального ризику інфікування.
- Провести оцінку ймовірності ризику передачі інфекції медпрацівникам, які контактували з хворими COVID-19.
- Виключити скупченість в залах очікування, забезпечивши попередній запис на контрольні відвідування здорових людей та імунізацію.
- Проінформувати осіб, які забезпечують догляд дитини та присутні під час вакцинальної сесії про заходи профілактики COVID-19, включаючи засоби індивідуального захисту органів дихання, а також важливість соціального дистанціювання (перебувати на відстані не менше 1 метра від інших осіб).



в. Умови середовища та інженерні засоби управління

- Проводити вакцинацію бажано в спеціалізованих амбулаторіях або в окремому кабінеті лікувально-профілактичного закладу.
- Виділіть окремі вентилязовані приміщення і забезпечте умови для соціального дистанціювання як для осіб, які забезпечують догляд за дітьми, так і для дітей, які очікують імунізацію.

г. Стандартні заходи безпеки

- Дотримуйтесь гігієни рук, використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Також виключте можливість травмування голками або гострими предметами, дотримуйтесь порядку утилізації відходів, очищення і дезінфекції обладнання та приміщень, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, які були розроблені для реагування недопущення поширення COVID-19.
- Медпрацівники та обслуговуючий персонал повинні отримати усі передбачені щеплення з урахуванням поточної ситуації.

д. Попит на вакцини та їх постачання

- Слід враховувати, що обмеження щодо переміщення населення і товарів, зміни у запланованих вакцинальних сесіях, мінливий попит на вакцини й підвищення рівня втрати вакцин за наявних обставин можуть негативно вплинути на попит вакцин та їх постачання. Слід регулярно оновлювати прогнозовані показники, частоту постачання та рівень буферного запасу вакцин з урахуванням наявних можливостей обладнання холодового ланцюга.

е. НППІ

- Слід передбачити підвищений ризик появи НППІ внаслідок триваючого розповсюдження та передачі SARS-CoV-2, що збігається з вакцинацією. Після введення вакцини усі, хто її отримали повинні перебувати під медичним наглядом. Для підтримки довіри суспільства до імунізації мають бути розроблені дієві стратегії інформування, розслідування, оцінки причинно-наслідкового зв'язку серйозних НППІ та встановлення їх причин.

